

COVID-19 बूस्टर टीके बनाम तीसरी खुराक

इनमें क्या अंतर है?



तीसरी खुराक

- मॉडर्ना (Moderna) और फ़ाइज़र-बायोएनटेक (Pfizer-BioNTech) के टीके लगवाने वालों के लिए उपलब्ध।
- दूसरी खुराक के 28 दिन बाद लगवाई जा सकती है।
- मध्यम या गंभीर रूप से कमज़ोर प्रतिरक्षा तंत्र वाले ऐसे लोगों को लगाई जाती है जो संक्रमणों से अच्छी तरह नहीं लड़ सकते हैं (जैसे, कैंसर ग्रस्त लोग, अंग प्रत्यारोपण करवाने वाले लोग, आदि)।

बूस्टर शॉट

- फ़ाइज़र (Pfizer) और मॉडर्ना (Moderna) की बूस्टर खुराकें दूसरी खुराक के 6 माह बाद लगवाई जा सकती हैं। जॉनसन एंड जॉनसन (Johnson & Johnson) की बूस्टर खुराक शुरुआती खुराक के 2 माह बाद लगवाई जा सकती है।
- 65 वर्ष एवं अधिक आयु वाले वयस्कों, दीर्घकालिक देखभाल इकाइयों के रोगियों, और चिकित्सीय या व्यावसायिक जोखिम वाले 18 से 64 वर्ष के वयस्कों के लिए उपलब्ध।
- आप किसी भी अधिकृत COVID-19 बूस्टर टीके की एक खुराक लगवा सकते हैं। याद रखें, किसी भी बूस्टर टीके को लगवाने की यह स्वतंत्रता केवल बूस्टर खुराक के मामले में लागू है।



मुझे बूस्टर खुराक या तीसरी खुराक कहां लग सकती है?

आपको यह खुराक आपकी स्थानीय फार्मसी, स्वास्थ्य विभाग या आपके प्राथमिक देखभाल चिकित्सक से लग सकती है।



मुझे अधिक जानकारी कहाँ मिल सकती है?

टीकाकरणों, बूस्टर खुराकों और परीक्षण के बारे में प्रश्नों के लिए COVID-19 हॉटलाइन 1(800) 889-3931 पर कॉल करें। आप अपने प्रश्न DPH.SICK@Illinois.gov पर ईमेल भी कर सकते हैं।



मुझे बूस्टर खुराक या तीसरी खुराक क्यों लगवानी चाहिए?

वायरस के विरुद्ध संरक्षण समय के साथ घट सकता है और उसके परिवर्तनों (वेरिएंट्स) के विरुद्ध कम प्रभावी हो सकता है। अब आप एक ही सत्र में अपना COVID-19 टीका और फ़्लू का टीका, दोनों लगवा सकते हैं।