

# COVID-19 Бустерная и третья доза вакцины

## В чем разница?



### Третья доза вакцины

- Разработана для лиц, привитых вакцинами «Moderna» и «Pfizer-BioNTech».
- Можно вводить через 28 дней после вакцинации второй дозой.
- Предназначена для людей со средне или сильно ослабленным иммунитетом, организм которых не способен успешно бороться с инфекциями (онкобольные, пациенты после трансплантации органов и т. д.)

### Бустерная доза вакцины

- Бустерные дозы вакцин «Pfizer» и «Moderna» можно вводить через 6 месяцев после вакцинации второй дозой. Бустерную дозу вакцины «Johnson and Johnson» можно вводить через 2 месяца после вакцинации начальной дозой.
- Можно использовать для вакцинации пожилых людей в возрасте от 65 лет, пациентов учреждений длительного ухода и лиц зрелого возраста от 18 до 64 лет с медицинским или профессиональным риском
- Можно свободно использовать бустеры независимо от того, какой ранее использовался разрешенный бустер против COVID-19. Помните, что это допускается только в отношении бустерной дозы



#### Где я могу привиться бустерной вакциной или получить третью дозу?

Вы можете привиться в местной аптеке, в отделении здравоохранения либо у вашего лечащего врача



#### Где можно получить дополнительную информацию?

По вопросам вакцинации, бустерных вакцин и тестирования звоните на горячую линию COVID-19 по номеру: 1(800) 889-3931. Также вы можете отправить свои по электронной почте: [DPH.SICK@Illinois.gov](mailto:DPH.SICK@Illinois.gov).



#### Почему мне нужно вакцинироваться бустером или третьей дозой?

Защита против вируса со временем может снижаться и становиться менее эффективной против штаммов вируса. Теперь вакцинироваться против COVID-19 и гриппа можно одновременно.