Riesgos para los niños: señales de envenenamiento con metadona

Debido a su poco peso, los niños pequeños pueden envenenarse fácilmente aún consumiendo el residuo de una dosis de metadona creada para el peso de un adulto.

Síntomas de un envenenamiento con metadona

- Letargo
- "Pupilas muy pequeñas" *(la pupila del ojo se contrae y se hace más pequeña)*
- Dificultad para respirar
- Ronquidos/Gorgoteos inusuales
- Palidez
- Desarrollo de un sudor frío y pegajoso
- Pérdida de la conciencia

LLAME AL 911

Si usted cree que su hijo ingirió metadona, LLAME AL 911 INMEDIATAMENTE.

- Aún una pequeña cantidad de metadona puede ser fatal.

Números útiles

Servicio de consultas sobre alcohol y drogas
1-800-622-2255

Departamento de Servicios Humanos de Illinois
1-800-843-6154

División de Alcoholismo y Abuso de Sustancias del Departamento de Servicios Humanos de Illinois (DASA)
1-800-213-0548

Línea directa de Salud Mental/Intervención de Crisis
1-800-248-7475

Línea directa de Control de Envenenamiento
1-800-222-1222

Fuentes: Departamento de Servicios Comunitarios de New South Wales NSW Health; Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano

© Oficina del Inspector General, Departamento de Servicios para Niños y Familias

Illinois Department of DCFS Children & Family Services

312.814.6800
www.DCFS.illinois.gov

Impreso bajo la autoridad del estado de Illinois
DCFS #000 – Abril 2015 – 000 copias
CFS 1050-66-3-S – 4/2015

Practique seguridad contra la metadona

Mantener seguros a los niños de envenenamiento accidental con metadona



Illinois Department of DCFS Children & Family Services

Oficina del Inspector General, Departamento de Servicio para Niños y Familias

Almacenamiento seguro de metadona

SÍ

Almacene su metadona lejos del alcance de un niño. Por ejemplo:

- Una caja cerrada con llave
- Un armario cerrado con llave, o
- Un armario o estante bien alto.

NO

No coloque metadona al alcance de un niño. Por ejemplo:

- Dentro del refrigerador
- Mesadas
- Armarios bajos
- Repisa de una ventana
- Cajón
- Ropero
- Piso del clóset
- Guantera del automóvil, o
- Mesa auxiliar.

¿Dónde almacena usted su metadona?

_____

_____

_____

_____

Peligros de mezclar y almacenar metadona

Cada año se registran muertes de niños pequeños como resultado de la ingesta de pequeñas cantidades de metadona mezcladas con agua o bebidas, y almacenadas en contenedores que no son a prueba de niños.

Nunca mezcle y almacene metadona en un contenedor que no esté etiquetado. Un niño murió cuando un cuidador le dio una botella plástica de agua del refrigerador. Sin que el cuidador lo supiera, el líquido de la botella había sido mezclado con metadona. Asegúrese de informar a los otros adultos del hogar dónde y en qué contenedor usted almacena su metadona.

Nunca mezcle y almacene metadona en cualquier otra cosa que no sea un contenedor a prueba de niños. Un niño murió después de beber metadona que había sido dejada en una mesa auxiliar de la sala. La metadona no estaba en un contenedor a prueba de niños.



Otro niño murió después de beber metadona que había sido mezclada con un líquido y almacenada en el refrigerador. El padre pensó que el niño no podría abrir el refrigerador.

Nunca beba su metadona frente a un niño.

Nunca deje metadona al alcance de los niños

Nunca almacene ni deje su metadona en un lugar de fácil acceso para niños.

Tenga en cuenta el nivel de actividad personal de su hijo (por ejemplo: gatear, caminar) cuando planifique el almacenamiento de su metadona.